MUDr. Mohamad El Hajj
Gastroenterologická ambulance
Josefská 577/10, Teplice 41501
tel.: +420777450108

Informovaný souhlas s endoskopickým vyšetřením žaludku (Gastroskopie) podle § 28 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

Jméno a příjmení pacienta: .....

Datum narození: .....

Kód zdravotní pojišťovny: .....

ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ HORNÍ ČÁSTI TRÁVICÍ TRUBICE (EZOFAGO-GASTRO-DUODENOSKOPIE)

Gastroskopie je invazivní výkon, při kterém lékař zavede přístroj/endoskop ústy do žaludku a dvanáctníku. V průběhu vyšetření dýchejte klidně nosem a sliny nepolykejte, ale vypouštějte je do připravené buničiny. Proto je k jeho provedení nutný Váš výslovný a informovaný souhlas. Před jeho udělením musíte být zcela a pro Vás srozumitelným způsobem informován/a o povaze výkonu a eventuálních rizicích. Lékař Vám sdělí všechny potřebné podrobnosti a vysvětlí Vám veškeré nejasnosti. Informovaný souhlas bude součástí Vaší zdravotnické dokumentace.

Příprava k vyšetření: Dieta – před vyšetřením alespoň 8 hodin nejezte a nepijte. K utišení žízně výjimečně pijte jen čiré tekutiny.

Znecitlivění: Bezprostředně před vyšetřením Vám provedeme místní znecitlivění dutiny ústní lokálním anestetikem. Vyšetření v indikovaných případech provádíme v sedaci - tj. po nitrožilní aplikaci léků tlumících nepříjemné pocity. V každém případě není možné po provedení vyšetření v sedaci řídit motorové vozidlo nebo vykonávat práci vyžadující soustředění a pozornost. V tomto případě je doporučeno zajištění odvozu a doprovodu druhé osoby. .

Komplikace: Absolutní bezrizikovost jakéhokoliv vyšetření nemůže zaručit žádný lékař. Tento výkon je, stejně jako ostatní endoskopická vyšetření, velmi bezpečný.

Celkové komplikace: reakce na podané léky, dechové, oběhové komplikace.

Endoskopické komplikace: nejzávažnější je proděravění zažívacího traktu, krvácení, případně bakteremie a sepse (vyplavení bakterií do oběhu). Tyto komplikace si mohou vyžádat hospitalizaci a léčení, případně operační výkon. Mohou se projevovat zejména náhlým krvácením ze zažívacího traktu a bolestmi břicha.

Alternativní postup: Alternativou je RTG vyšetření s podáním kontrastní látky.

Po vyšetření: Po diagnostickém vyšetření při lokálním znecitlivění 30minut nejezte a nepijte. Pokud byla aplikována uklidňující injekce, nesmíte vzhledem k omezení Vašich reakcí během následujících 24 hodin řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroj.

poznámky lékaře:

ALERGIE/NESNÁŠENLIVOST.....

KRVÁCIVOST.....

Souhlasím s navrženým vyšetřením a dalšími nutnými zákroky. Byla/byl jsem seznámen/a, pro mě srozumitelnou formou, se způsobem provedení výkonů. Měla/měl jsem možnost se zeptat na vše, co mi připadalo důležité a bylo mi vše srozumitelně zodpovězeno. O možnosti odmítnutí jsem byla/byl informován.

Souhlasím s výkonem..... Nesouhlasím s výkonem .....

V Teplicích dne …….....

podpis pacienta ..... podpis lékaře.....

podpis svědka ……